

MIGRAÑA CRONICA Y BOTOX

Coordinador: DR. CARLOS MARSAL ALONSO

Neurología IMI Toledo

LA MIGRAÑA CRONICA se define en pacientes que durante tres meses seguidos tienen, al menos, 15 días de cefalea (dolor de cabeza) y, de ellos, ocho son de tipo migraña.

Aproximadamente el 2% de la población la padece en algún momento de su vida, y es una situación de difícil manejo que conlleva a menudo el abuso de analgésicos y la transformación en una CEFALEA CRONICA DIARIA.

Con la APLICACION DE BOTOX (Toxina Botulínca), el 70% de los pacientes vieron reducidas sus crisis a la mitad, tienen ocho días menos de cefaleas al mes, y redujeron los otros medicamentos para el tratamiento de sus dolores de cabeza que debían tomar. Además, como el Botox es muy conocido, el perfil de seguridad y sus efectos adversos son predecibles, menores y transitorios, como molestias en la zona de los pinchazos o la "caída del párpado".

El efecto dura entre tres y cuatro meses y luego hay que reinfiltrar (3 a 4 sesiones al año)

Los cuestionaros de satisfacción de los pacientes que sufren MIGRAÑA CRONICA con el tratamiento muestran la gran aceptación del mismo.