

## **PROCEDIMIENTOS DE GINECOESTÉTICA**

HOY EN DÍA DISPONEMOS DE MULTITUD DE PROCEDIMIENTOS QUE HACEN QUE LA MUJER PUEDA TENER GRANDES AVANCES EN SU CALIDAD DE VIDA, POR LA MEJORA FUNCIONAL Y ESTÉTICA SOBRE ESTA ZONA.

LOS TRATAMIENTOS DE SU ZONA INTIMA HARÁN QUE LA MUJER , EN TODAS LAS ETAPAS DE SU VIDA, SOBRE TODO EN EL POSTPARTO Y LA MENOPAUSIA, ORIGINEN UN IMPACTO POSITIVO EN LA SALUD VULVOVAGINAL Y FUNCIONALIDAD DE LA MISMA.

### **CIRUGÍA DE RECONSTRUCCIÓN DE HIMEN( HIMENOPLASTIAS)**

LA HIMENOPLASTIA ES UNA CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA QUE POR MOTIVOS RELIGIOSOS, CULTURALES O MORALES PUDE SER UNA ALTERNATIVA PARA LA PACIENTE.

CONSISTE EN REHACER EL HIMEN CON TEJIDO PROPIO . ESTE PROCEDIMIENTO SE REALIZA BAJO ANESTESIA LOCAL, NO NECESITA INGRESO Y LA RECUPERACIÓN ES INMEDIATA.

### **LABIOPLASTIA LÁSER**

UN NÚMERO, NADA DESDEÑABLE DE MUJERES , PRESENTAN PROBLEMAS FUNCIONALES DEBIDO A QUE LOS LABIOS MENORES SOBREPASAN A LOS MAYORES Y ESTO PUEDE PROVOCAR MOLESTIAS EN LAS RELACIONES SEXUALES, PRÁCTICA DE DETERMINADOS DEPORTES E INCLUSO DIFICULTA EL USO DE ROPA AJUSTADA.

ESTE PROCEDIMEINTO CONSISTE EN LA REDUCCIÓN DE LOS LABIOS MENORES MEDIANTE LASER DE CO2( GYNELASE). LA GRAN VENTAJA DE ESTA MODALIDAD EN COMPARACIÓN CON LA CIRUGÍA CLÁSICA, ES LA MAYOR PRECISIÓN, MENOR INFLAMACIÓN DE LOS TEJIDOS Y MINIMAS MOLESTIAS POSTERIORES AL MISMO. SE REALIZA CON ANESTESIA LOCAL (+/- SEDACIÓN) , SIN HOSPITALIZACIÓN, CON UNA RÁPIDA INCORPORACIÓN A SU VIDA COTIDIANA

### **REDUCCIÓN CAPUCHÓN DEL CLÍTORIS CON LÁSER**

EN OCASIONES, EL CAPUCHÓN DEL CLÍTORIS ESTÁ HIPERTROFIADO, ES DECIR, QUE EL REPLIEGUE DE PIEL QUE LO CUBRE ES

EXCESIVAMENTE GRANDE Y POR ELLO, A VECES LAS RELACIONES SEXUALES NO SON TAN SATISFACTORIAS. SU EXCISIÓN SE REALIZA CON ANESTESIA LOCAL, SIN NECESIDAD DE HOSPITALIZACIÓN Y CON UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN.

### **SINDROME DE RELAJACIÓN VAGINAL/ REJUVENECIMIENTO VAGINAL**

PRINCIPALMENTE TRAS LOS PARTOS, EL TEJIDO COLÁGENO DE LA VAGINA, SUELE SUFRIR CAMBIOS QUE HACEN QUE SE PROVOQUE UNA HIPERLAXITUD, ESTO ES UN AUMENTO DE TAMAÑO Y PERDIDA EN MAYOR O MENOR GRADO DE LA FUNCIONALIDAD VAGINAL, QUE PUEDE SER UN GRAN FACTOR DE RIESGO DE PATOLOGÍAS COMO LA INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO, PROLAPSOS DE LOS ORGANOS PÉLVICOS Y DISMINUCION DE LA SENSIBILIDAD EN LAS RELACIONES SEXUALES.

EN OCASIONES, SE PRODUCEN INFECCIONES URINARIAS DE REPETICIÓN, COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE LACTOBACILOS EN LA MUCOSA VAGINAL, DEBIDO A LA ATROFIA. ESTA SISTEMATOLOGÍA PUEDE MEJORAR SUSTANCIALMENTE CON LA RECUPERACIÓN DE LAS CARÁCTERÍSTICAS INNATAS DE LA MUCOSA VAGINAL EN LA EDAD REPRODUCTIVA .

LA CORRECCIÓN DE LA MISMA CON LÁSER DE CO2 ES SENCILLA, SEGURA Y SIN DOLOR . EL PROCEDIMIENTO OCUPA 20-30 MIN, CON ANESTESICO LOCAL EN CREMA Y CON 2 Ó 3 SESIONES DEPENDIENDO DE LA VALORACIÓN MÉDICA.

### **SEQUEDAD VAGINAL / ATROFIA / LIQUEN**

LA SEQUEDAD VAGINAL, PUEDE APARECER EN CUALQUIER MOMENTO EN LA VIDA ACTIVA SEXUAL DE UNA MUJER, DESARROLLANDO EN OCASIONES RELACIONES DOLOROSAS Y CON CONSECUENCIAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS PARA LA MISMA. LA ATROFIA, SE PRODUCE MUY HABITUALMENTE, EN LA MENOPAUSIA, Y CUANTO MÁS PROLONGADO SEA EL PERIODO DESDE QUE COMENZÓ.

EL TRATAMIENTO PUEDE IR DESDE LAS INFILTRACIONES DE ÁCIDO HIALURÓNICO EN LA MUCOSA VAGINAL, PLASMA RICO EN PLAQUETAS ( P.R.P.) Y 2 Ó 3 SESIONES DE LÁSER DE CO2 SEGÚN VALORACIÓN MÉDICA. TODAS ELLAS CON ANESTESIA LOCAL EN CREMA , SIN DOLOR Y CON RECUPERACIÓN INMEDIATA.

### **INCONTINENCIA URINARIA DE ESFUERZO ( IUE)**

LOS PROBLEMAS QUE SUPONEN LA PÉRDIDA INVOLUNTARIA DE ORINA, HACEN BUSCAR SOLUCIONES FERVIENTEMENTE PARA ESTE PROBLEMA, QUE NO ES SOLO UN PROBLEMA DE SALUD, SINO UNA IMPORTANTE CAUSA DE DEPRESIÓN Y AISLAMIENTO SOCIAL. TRAS LOS PARTOS ESTA DOLENCIA SUMERGE MÁS FRECUENTEMENTE.

TRAS UNA RIGUROSA VALORACIÓN DEL PROBLEMA, SE VALORARÁ EL TRATAMIENTO CON LÁSER DE CO<sub>2</sub>.

ESTE PROCEDIMIENTO ES SENCILLO, SE REALIZA CON ANESTESICO LOCAL EN GEL, EN 2 Ó 3 SESIONES DE 20 A 30 MIN Y CON UNA INMEDIATA INCORPORACIÓN A SU VIDA DIARIA.

### **REMODELACIÓN DE LABIOS MAYORES**

CON EL PASO DE LOS AÑOS, LOS LABIOS MAYORES VAN PERDIENDO TURGENCIA, SE VULVEN MÁS FLÁCIDOS Y ESTA CIRCUNSTANCIA A VECES SUPONE UNA MOLESTIA O UN DISCONFORT CON EL ASPECTO DE LOS MISMOS.

EL RELLENO DE LOS LABIOS MAYORES CON ÁCIDO HIALURÓNICO, ES UN PROCEDIMIENTO SENCILLO, SE REALIZA CON ANESTESIA LOCAL Y CON MUY BUENOS RESULTADOS ESTÉTICOS.

### **POTENCIACIÓN DEL PUNTO "G"**

UNO DE LOS PUNTOS ERÓGENOS MÁS CONOCIDOS ES EL PUNTO "G". CON UNA INFILTRACIÓN DE ÁCIDO HIALURÓNICO PODEMOS SOBREELEVAR LA ZONA TEÓRICA DEL MISMO Y HACER QUE LAS RELACIONES SEXUALES SEAN MÁS SATISFACTORIAS.

SE REALIZA EN CONSULTA CON ANESTESIA LOCAL EN GEL Y CON MINIMAS MOLESTIAS POSTPROCEDIMIENTO.

### **TRATAMIENTO DEL VAGINISMO CON TOXINA BOTULÍNICA**

EL VAGINISMO ES UNA DISFUNCIÓN PROVOCADA POR UN ESPASMO INVOLUNTARIO Y DOLOROSO DE LOS MÚSCULOS QUE RODEAN A LA VAGINA. DEPENDIENDO DE LA SEVERIDAD DEL CUADRO PUEDE SER TRATADO Y SOLUCIONADO EL PROBLEMA CON DIFERENTES PROCEDIMIENTOS. CUANDO LA CLÍNICA ES SEVERA Y NO HA CEDIDO CON OTROS TRATAMIENTOS, LA OPCIÓN DE UTILIZAR TOXINA

BOTULÍNICA PARA LA RESOLUCIÓN DEL CUADRO, TIENE MUY BUENOS RESULTADOS.

TRAS UNA PROFUNDA VALORACIÓN MÉDICA SE VALORARÁ EL NÚMERO DE SESIONES, QUE HABITUALMENTE SE ESPACIAN UNA SEMANA. LAS INFILTRACIONES SE REALIZAN CON ANESTESIA LOCAL .

### **VAPORIZACIÓN DE CONDILOMAS GENITALES CON LÁSER DE CO2**

LOS CONDILOMAS GENITALES PUDEN SER UNA AFECTACIÓN MUY MOLESTA Y APARATOSA PARA LA PACIENTE.

LA VAPORIZACIÓN DE LOS MISMOS CON LÁSER DE CO2 OFRECE UN TRATAMIENTO MUY EFICAZ CON MINIMAS MOLESTIAS Y SIN LESIÓN RESIDUAL.

EL PROCEDIMIENTO SE REALIZA CON ANESTESIA LOCAL Y TIEMPO DE REALIZACIÓN DEPENDERÁ DEL NÚMERO Y EL TAMAÑO DE LOS MISMOS.

### **VERRUGAS VULGARES GENITALES**

EL TRATAMIENTO CON LÁSER DE CO2 HACE DESAPARECER ESTAS LESIONES DE UNA MANERA RÁPIDA, SIN DOLOR Y CON UN EXCELENTE RESULTADO ESTÉTICO.

EL PROCEDIMIENTO SE REALIZA CON ANESTESIA LOCAL

### **RESURFACING DE CICATRIZ DE EPISIOTOMIA**

ENTRE LAS LESIONES RESIDUALES QUE PUEDEN PERMANECER TRAS LOS PARTOS, NOS PODEMOS ENCONTRAR EPISIOTOMÍAS CON UNA CICATRIZ RETRAIDA Y ANÓMALA QUE PROVOCA DOLOR ESPONTÁNEO Y/O CON LAS RELACIONES SEXUALES A LA PACIENTE. EL EFECTO TÉRMICO DEL LÁSER DE CO2 PRODUCE UNA REACCIÓN DE ESTIMULACIÓN DEL COLÁGENO QUE HACE QUE MEJORE LA ZONA TRATADA.

LA INFILTRACIÓN DE LA CICATRIZ CON ANESTESICO LOCAL Y ÁCIDO HIALURÓNICO PROVOCA UNA MEJORA SUSTANCIAL TANTO EN LA SINTOMATOLOGÍA COMO EN EL ASPECTO ANATÓMICO DE LA MISMA.

## **BARTHOLINITIS CON LÁSER**

LA BARTHOLINITIS EN UNA INFECCIÓN DE LA GLÁNDULA DE BARTHOLINO , GLÁNDULA LOCALIZADA A NIVEL VULVAR. EL PROCESO ES PROVOCADO POR LA OBSTRUCCIÓN DEL CONDUCTO DE SALIDA Y SU INFECCIÓN POSTERIOR. ES MUY DOLOROSO E INCAPACITANTE PARA EL PACIENTE.

LA RESOLUCIÓN DE ESTE CUADRO CON LÁSER DE CO2 (VAPORIZANDO SU CÁPSULA) SUPONE UN ADELANTO MUY LLAMATIVO, DEBIDO A QUE SE REALIZA CON ANESTESIA LOCAL ( +/- SEDACIÓN) Y DEBIDO A LA MINIMA INFLAMACIÓN Y EDEMATIZACIÓN TRAS EL PROCESO LA POSTERIOR RECUPERACIÓN ES MUY RÁPIDA Y CON LEVES MOLESTIAS EN COMPARACIÓN CON LA CIRUGÍA CLÁSICA.